

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

General Caudadat

Tamaño: Medio.

Forma: Tronco-cónica o esférico aplastada por los dos polos. Contorno regular o levemente irregular, a veces marcando acostillado.

Cavidad del pedúnculo: Amplia o mediana, de profundidad poca o media, con fondo de chapa ruginosa. Bordes irregularmente ondulados.

Cavidad del ojo: Amplia o mediana, poco profunda. Bordes suavemente ondulados. **Ojo:** Pequeño y cerrado. Sépalos suavemente separados en su base, de forma triangular, anchos, convergentes, quedando todas las puntas juntas en forma de cono, de tono gris verdoso y tomentoso.

Piel: Fina, untuosa. **Color:** Amarillo verdoso grisáceo, exento de chapa. Punteado abundante, ruginoso, pequeño y aureolado de blanco; otros blanco grisáceo y alguno por transparencia.

Tubo del cáliz: Estrecho o ancho, en forma de cono o en embudo de tubo estrecho y medianamente largo. Estambres situados bajos. Eje y celdas cerradas en su mayoría, con el corte transversal de brazos muy cortos. Por el contrario, en otros frutos el eje es agrietado y las celdas pequeñas en forma semi-triangular, con la roseta del corte transversal de brazos regularmente pequeños.

Corazón: Pequeño, bulbiforme alargado, desplazado hacia el pedúnculo.

Semillas: De forma variada y abundantes.

Carne: Blanco-verdosa o crema. Crujiente, jugosa, volviéndose algo harinosa. **Sabor:** Acidulado.

Maduración: Otoño-Invierno.

